

Aus der Universitäts-Frauenklinik Heidelberg

Direktoriat: Professor Dr. H. Eymers



# Experimentelle Untersuchungen über die Wehentätigkeit der Gebärmutter in den letzten Schwangerschaftsmonaten

Inaugural-Dissertation  
zur Erlangung der medizinischen Doktorwürde  
einer hohen Medizinischen Fakultät  
der Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg

vorgelegt von

ADOLF NEESE

aus Saarbrücken



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

Aus der Universitäts-Frauenklinik Heidelberg  
Direktoriat: Professor Dr. H. Eymer\*

# Experimentelle Untersuchungen über die Wehentätigkeit der Gebärmutter in den letzten Schwangerschaftsmonaten

Inaugural-Dissertation  
zur Erlangung der medizinischen Doktorwürde  
einer hohen Medizinischen Fakultät  
der Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg

vorgelegt von

ADOLF NEESE

aus Saarbrücken

\* Der Arbeit liegen Versuche aus dem Jahr 1933/1934 zu Grunde

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät  
der Universität Heidelberg

Der Referent: Prof. Dr. Schmincke

Der Dekan: Prof. Dr. C. Schneider

1937

Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Wehentätigkeit der schwangeren Gebärmutter sind eigentlich erst seit einigen Jahren wieder erneut in Angriff genommen worden. Anlaß hierzu gaben vor allem die Entdeckung wehenerregender Stoffe und das Bestreben, die Ursache des Geburtseintritts näher kennenzulernen.

Es ist erstaunlich, feststellen zu müssen, daß gerade ein Naturvorgang, wie ihn doch die Geburt darstellt, auch heute noch nicht vollkommen erklärt werden kann. Zwar hat die Tatsache, daß die menschliche Schwangerschaft in der Regel 280 Tage dauert, und daß nach diesem Zeitpunkt die Frucht mit ihren Anhängen durch einen fein eingeprägten Mechanismus an die Außenwelt befördert wird, von jeher lebhaftes Interesse gefunden. Schon die Ärzte des Altertums haben sich mit dieser Frage beschäftigt und zum Teil merkwürdige Vorstellungen über den Geburtsvorgang gehabt. So war Hippokrates der Ansicht, daß das Kind, durch Hunger veranlaßt, die Geburt selbst einleite und durch Anstemmen mit den Füßen an den Gebärmuttergrund die Weichteile der Mutter eröffne, wobei auch die Schwerkraft eine Rolle spiele. — Wesentlich besser hat Galen den Geburtsvorgang gedeutet, indem er die Bedeutung der Zusammenziehung der Gebärmutter während des Geburtsvorganges erkannte. Doch haben seine Anschauungen zu seiner Zeit keinen Einfluß auf die medizinische Lehre gewonnen. So kam es, daß erst der schweizer Physiologe Albrecht v. Haller auf Grund gewisser Beobachtungen die austreibende Kraft der Gebärmutter als etwas Neues hervorhob, und daß noch Ende des 18. Jahrhunderts der bedeutende Geburtshelfer Baudelocque betonte, daß sich die Gebärmutter „fast ebenso wie die

Muskeln“ zusammenziehen könne. Eine wissenschaftliche Erforschung der Geburts- und Wehentätigkeit der Gebärmutter wurde aber erst durch die Arbeiten F. A. Kehrers, der am Ende des vorigen Jahrhunderts mit den Methoden der Physiologie diese Probleme zu lösen versuchte, eingeleitet.

Es ist sehr interessant, zu sehen, welche Anschauungen von den Forschern der letzten Zeit über die Ursache des Geburtseintrittes geäußert worden sind. So nahm Mauriceau an, daß die Uterusbewegungen durch die Überdehnung der Gebärmutter am Ende der Schwangerschaft ausgelöst würden. Keilmann und Knüpfer glauben, daß durch die am Ende der Schwangerschaft statthabende Erweiterung des unteren Uterinsegments die dort gelegenen nervösen Elemente gereizt würden, und daß dadurch die Uterusbewegungen ausgelöst würden. —

Auf Naegele geht die Ansicht zurück, daß am Ende der Schwangerschaft das Ei infolge nekrobiotischer Vorgänge im Bereich der Plazenta und der Decidua als Fremdkörper wirke und so zur Wehentätigkeit des Uterus Veranlassung gäbe. — Interessant ist ferner die Vorstellung gewisser Autoren, daß die kumulativwirkung der total ausgebliebenen Periode das auslösende Moment der Wehentätigkeit sei. Diese Ansicht, die von Mendl ausging, und die auch, wenn auch in abgeänderter Form, von Schatz übernommen wurde, hat vielleicht etwas Richtiges. Denn die klinische Erfahrung lehrt immer wieder, daß bei Frauen mit regelmäßigem Menstruationstypus in der Schwangerschaft an den Tagen der zu erwartenden Periode der Uterus zweifellos eine gewisse Kontraktionsbereitschaft aufweist, und daß gerade an diesen Tagen bei manchen Frauen eine gewisse Neigung zu Blutungen und Fehlgeburten besteht.

Eine Reihe anderer Forscher hat die Theorie aufgestellt, daß am Ende der Schwangerschaft im schwangeren Organismus geburtsauslösende Stoffe auftreten, die bei einer gewissen Konzentration die Wehentätigkeit anregen sollen.

Eine experimentelle Stützung dieser Anschauung wurde mit den Versuchen von Sauerbruch und Heyde angestrebt, deren tierexperimentelle Ergebnisse aber nach den Erfahrungen beim Menschen (Geburt bei den zusammengewachsenen Geschwistern Blazek) für diesen nicht zutreffen dürften.

Neue Wege zur Klärung dieses Fragekomplexes schienen sich zu ergeben, als mehrere im Organismus erzeugte Stoffe bekannt wurden, die eine elektive Wirkung auf die glatte Muskulatur und damit auch auf den Uterus aufwiesen. Es handelte sich dabei im wesentlichen um Stoffe innersekretorischer Drüsen. So wurde von Neu die Adrenalinvermehrung im Blute Schwangerer als auslösender Faktor für die Geburt angesehen, während andere wiederum an eine Wirkung des Hypophysenhinterlappenhormons dachten, dessen besondere wehenerregende Kräfte ja in der klinischen Therapie weitgehend Eingang gefunden haben. Daß auch in der Plazenta, insbesondere von Guggisberg und seinen Schülern, wehenerregende Stoffe gefunden wurden, sei nur nebenbei erwähnt. Auch eine Änderung des Ionenhaushalts im schwangeren Organismus zu Beendigung der Tragzeit wird von einigen Forschern (Rossenbeck) für den Beginn der Wehentätigkeit verantwortlich gemacht.

Überblicken wir diese zum Teil sehr geistreichen Vorstellungen, so läßt sich doch sagen, daß für viele Anschauungen zwar gewisse Stützen vorhanden sind, daß aber keine einzige dieser Theorien bisher in der Lage ist, eine vollständige und befriedigende Erklärung eines so interessanten Vorganges zu geben. Wir dürfen aber hoffen, daß systematische Erforschungen der Wehentätigkeit, der einzelnen Wehenformen und ihre Beeinflussung durch Pharmaka vielleicht doch einmal den Weg zeigen werden, der zur Lösung dieses Problems führt.

Gerade auf dem Gebiet der Wehenforschung ist ja in den letzten Jahren Bedeutendes geleistet worden. Ich möchte hier nur erwähnen die Arbeiten von Frey und

feinen Schülern und Mitarbeitern, die bezüglich der Wehentätigkeit des gebärenden Uterus viel Neues gebracht haben und durch deren Arbeiten vor allem auch die Methodik der Wehenschreibung einen großen Aufschwung genommen hat. Die Vernachlässigung eines so wichtigen Gebiets, wie es die Wehentätigkeit für einen Kliniker darstellt, ist sicher nicht zuletzt bedingt gewesen durch die Unvollkommenheit der Untersuchungsmethoden, die dem Forscher hier zur Verfügung standen. Zwar gab es immer schon eine Reihe von Verfahren, die eine graphische Registrierung der Wehentätigkeit ermöglichten, doch bestanden diese vorwiegend in dem Einführen luft- oder flüssigkeitsgefüllter Bläschen in das Innere der Gebärmutter und brachten somit stets die Gefahren eines intrauterinen Eingriffes mit sich. Heute sind diese Methoden, mit denen u. a. Schatz seine vorzüglichen Wehenkurven erzielte, vollkommen außer Gebrauch geraten und haben Methoden Platz gemacht, die durch die Bauchdecken hindurch den Wehenablauf der Gebärmutter zu erfassen suchen. Von diesen Methoden seien erwähnt das Crodel'sche Verfahren der Wehenmessung, die Wehenmesser von Frey und Löwi, die beide auch den Wehenablauf graphisch registrieren.

Eine wesentliche Vervollkommnung der Wehenschreibung wurde vor allen Dingen durch den Wehenmesser von Rech gegeben. Der Rech'sche Wehenschreiber, der an der Universitäts-Frauenklinik Heidelberg entwickelt wurde, ermöglicht es, die Wehentätigkeit stundenlang auf mechanisch-elektrischem Wege fortlaufend zu registrieren und hat zudem den Vorteil, daß das Schreibgerät von der Untersuchungsperson völlig getrennt ist.

Meinen Untersuchungen lag nun die Aufgabe zugrunde, festzustellen, wie sich die Wehentätigkeit in den letzten Schwangerschaftsmonaten verhält. Es sollte vor allem geprüft werden, ob bei der gleichen Frau in den letzten Wochen der Schwangerschaft mit Herannahen des Geburtstermines eine Steigerung der Spontancontractionen statt-

findet, und ob außerdem mit nahendem Geburtstermin sich die Ansprechbarkeit der Gebärmutter auf wehenerregende Substanzen erhöht. Meine Untersuchungen wurden an schwangeren Frauen ausgeführt, die sich schon einige Wochen vor der Niederkunft in der Klinik befanden. Es wurde so vorgegangen, daß etwa alle 8 Tage bei den gleichen Patienten Wehenkurven aufgenommen wurden. Die Aufzeichnungen der Wehentätigkeit wurde mit dem Rech'schen elektro-mechanischen Wehenschreiber durchgeführt. Die Ergebnisse meiner Untersuchungen lassen sich am besten an Hand einiger Wehenkurven besprechen. Da nicht alle Wehenkurven wegen ihres Ausmaßes reproduziert werden konnten, seien nur einige typische Kurven hier besprochen.

Zur Bewertung der Kurven sei zunächst folgendes vorausgeschickt: Die Kurven sind von rechts nach links und von unten nach oben zu lesen. Auf der Abscisse sind Abstände in 1 cm Länge markiert, die je eine Minute betragen. Auf der Ordinate befindet sich eine Millimeter-Einteilung, die die Amplitude und den Ruhetonus erkennen läßt. Die Vergrößerung der Uterusausschläge ist dreifach, das heißt 3 mm Kurvenauschlag betragen in Wirklichkeit 1 mm. Es handelt sich also um eine Vergrößerung 1 : 3.




Kurve 1.

24jährige I-Para, 50 Tage vor der Niederkunft.

Der durch keine chemischen oder mechanischen Reize angeregte Uterus zeigt leichte, in gewissem Rhythmus erfolgende Contractionen, die in Abständen von etwa einer Minute aufeinanderfolgen. Dabei dauert die Contraction fast genau so lange, wie die darauf folgende Ruhepause.

Der ganze Kurvenverlauf macht den Eindruck einer Wellenbewegung. Wir sehen jedenfalls, daß schon 7 bis 8 Wochen vor der Geburt eine leichte Wehentätigkeit vorhanden sein kann.


Nicht immer fand sich eine derartige Tätigkeit der Gebärmutter. In einigen anderen Fällen beobachteten wir einen fast glatten Verlauf der Kurve, also keinerlei Contractionen der Gebärmutter.



**Kurve 2.**

Gleiche Patientin wie bei Kurve 1; 39 Tage vor der Geburt.


Auch hier ist wieder eine rhythmische Tätigkeit der Gebärmutter zu sehen. Aber es ist ein gewisser Unterschied festzustellen, die Contractionen folgen schneller aufeinander und haben eine wechselnde Höhe. Die Amplitude der Contractionen hat zugenommen.



**Kurve 3.**

28jährige II-Para, 29 Tage vor der Niederkunft.

Auch hier zeigt die unbeeinflusste Gebärmutter eine gut erkennbare contractile Tätigkeit. Die Abstände zwischen den einzelnen Contractionen sind recht ungleichmäßig. Auch die Amplitude der Contractionen zeigt eine ungleichmäßige Höhe.



Kurve 4.


Gleiche Patientin wie auf Kurve 1 und 2, 9 Tage vor der Niederkunft.

Der Kurvenablauf zeigt schnell aufeinanderfolgende Contractionen von gleicher Höhe. Beachtenswert ist, daß der Ruhetonus in den Wehenpausen sehr stark schwankt.

Ähnliche Kurven wurden in großer Zahl gewonnen. Zusammenfassend ergab sich, daß schon 2 Monate vor der Geburt die Gebärmutter leichte Contractionen ausführt, die aber sehr gering sind, und deren zeitliche Abstände wesentlich geringer sind, als bei einer Wehentätigkeit unter der Geburt.

In einer weiteren Versuchsreihe wurde die Empfindlichkeit der Gebärmutter auf Wehenmittel geprüft. Insbesondere sollte hier festgestellt werden, ob durch eine besondere Ansprechbarkeit auf Wehenmittel etwa auf eine nahe bevorstehende Geburt Rückschlüsse gezogen werden können, wie dies z. B. von E. W. Winter u. a. behauptet worden ist.

Aus dem Kurvenmaterial von 22 Versuchen sei hier ein typischer Fall kurvenmäßig besprochen.




Kurve 5.

25jährige I-Para, 12 Tage vor dem Niederkunftstermin.

Die unbeeinflusste Gebärmutter zeigt eine rhythmische Tätigkeit. Unregelmäßige Contractionen mit wechselnder Amplitude folgen in Abständen von 1 bis 2 Minuten aufeinander. Der Ruhetonus der Gebärmutter zeigt starke


Schwankungen. Ein Vergleich mit den Kurven 1, 2 und 3 zeigt einen deutlichen Unterschied. Die Contractionen sind machtvoller geworden, die Pausen erscheinen etwas verlängert.



Kurve 6.

Gleiche Patientin, 12 Tage vor der Geburt. (Fortsetzung von Kurve 5.)

Bei Pfeil Injektion von 2 V. E. Hypophysin. Wir sehen, daß 4 Minuten nach der intramuskulären Injektion des Wehenmittels zunächst der Tonus der Gebärmutter stark




Kurve 7.

(Fortsetzung der Kurve 6.)

ansteigt, daß sich von dieser Tonuserhöhung aus leichte Contractionszacken ausbilden und daß dann allmählich eine, wenn auch unregelmäßige rhythmische Wehentätigkeit einsetzt, wobei der Ruhetonus der Gebärmutter sich erniedrigt.

Kurve 7 ist eine Fortsetzung von Kurve 6, doch liegt zwischen beiden hier wiedergegebenen Kurvenabschnitten eine Zeitspanne von 10 Minuten. Wir sehen zunächst noch eine sehr gute Wehentätigkeit mit rhythmischen Contraktionen und Amplituden erheblichen Ausmaßes und sehen aber dann nach weiteren 20 Minuten ein langsames Abflauen der Wehentätigkeit, erkennbar an dem Nachlassen der Amplitudenhöhe.


Zusammenfassend sei über diesen Versuch, der, wie hier bemerkt sei, von uns an vielen Patienten wiederholt worden ist, gesagt, daß auf intramuskuläre Injektion eines Wehenmittels die Gebärmutter mit einer typischen Wehenreihe reagiert unter vorangehender Tonuserhöhung, daß diese Wehentätigkeit aber nach 20 bis 40 Minuten wieder abklingt.



Kurve 8.

26jährige I-Para, 1 Tag vor der Niederkunft.


Kurve 8 zeigt die Spontantätigkeit der Gebärmutter. Wir sehen in Zeitabständen von 3 bis 7 Minuten kräftige Contraktionen eintreten, die aber einen durchaus unregelmäßigen Eindruck machen.



**Kurve 9.**

Bei der gleichen Patientin Injektion von 2 V. E. Hypophysin.

Auf die Injektion zunächst kleine, unerhebliche Contractionen, dann folgen 5 Minuten nach der Injektion kräftige Wehen in 2 Minuten Abstand.



**Kurve 10.**

Gleiche Patientin wie vorher. Die Kurve ist die Fortsetzung der Kurve 9, nur daß zwischen beiden Kurvenabschnitten eine Zeitpanne von 15 Minuten liegt.

Wir sehen rhythmische, wenn auch etwas unregelmäßige Contractionen von beträchtlicher Amplitude, die zunächst in Abständen von einer Minute aufeinanderfolgen. Dann wird aber der Zwischenraum zwischen den einzelnen Contractionen (Wehenpause) wieder wesentlich größer. Es ergab sich weiterhin, daß ungefähr nach einer Stunde die

durch das Wehenmittel angeregte Wehentätigkeit wieder erloschen war und die Spontancontractionen der Gebärmutter den gleichen Kurvenablauf zeigten, wie an der unbeeinflussten Gebärmutter. Interessant ist nun, daß am nächsten Tage nach diesem Versuch die Geburt erfolgte. Dieser hier wiedergegebene Versuch ist ganz typisch. Wir haben die gleiche Erfahrung bei 12 anderen Patienten machen können: auf Wehenmittel immer eine gesteigerte Wehentätigkeit, die aber sofort wieder nachließ. Es ergab sich kein Unterschied zwischen Frauen, die 12 Tage vor der Niederkunft standen, oder bei denen nach einem Tag die Geburt eintrat. Eine besondere Ansprechbarkeit auf Wehenmittel in den letzten Tagen vor der Niederkunft ist zwar vorhanden, aber es läßt sich aus keiner Wehenkurve der Schluß ziehen, daß tatsächlich die Geburt innerhalb der nächsten Tage erfolgen wird.

Auf Grund dieser Versuche kommt man zu dem Schluß, daß der Wert der Hypophysinprobe für die Diagnose der kurz bevorstehenden Niederkunft kaum brauchbar sein dürfte.

### **Zusammenfassung.**

Versuche an schwangeren Frauen in den beiden letzten Monaten vor der Niederkunft haben ergeben, daß schon 50 Tage vor der Niederkunft leichte Spontancontractionen der Gebärmutter vorhanden sein können und auch in der Mehrzahl der Fälle vorhanden sind, deren Größe (Amplitude) sich mit Herannahen der Geburt vermehrt. Dabei läßt sich deutlich erkennen, daß gegen Geburtsende hin die Pausen zwischen den einzelnen Contractionen etwas länger werden.

Weitere Versuche über die Beeinflußbarkeit der hochschwangeren Gebärmutter durch Wehenmittel haben ergeben, daß die Gebärmutter in der Regel auf Injektionen

von Wehenmitteln mit kräftigen, geregelten Contractionen antwortet, die aber nach einer verchieden langen Zeitdauer (30 bis 60 Minuten) wieder abklingen. Das auf diese Weise gewonnene Wehenbild läßt keinen Schluß zu bezüglich des Termins der bevorstehenden Geburt.

### Literatur.

1. Antoine, Taffilo: Physiologie und Pathologie der Wehen. — Wien 1935.
2. Crodel: . . . . Ztschr. f. Geb., Bd. 97, S. 138.
3. Frey: . . . . Ztbl. f. Gyn. 1933, S. 545.
4. Guggisberg: . . Die Wehen. In Halban / Seitz, Bd. VI, 2. Teil. — 1925.
5. Löwi: . . . . Ztbl. f. Gyn. S. 554. — 1933.
6. Rech: . . . . Arch. f. Gyn. Bd. 157, S. 458.
7. Rosenblatt: . . Monatschr. f. Geb. Bd. 85.
8. Rossenbeck: . . Arch. f. Gyn. Bd. 140.
9. Winter, E. W.: . Ztschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 102, S. 508.

## Lebenslauf.

Am 18. Januar 1909 wurde ich zu Metz-Montigny (Lothringen) geboren. Mit 6 Jahren trat ich in die Volksschule in Dortmund ein. Vom Jahre 1919 ab besuchte ich das Bismarck-Realgymnasium dortselbst. Durch die Veretzung meines Vaters, eines Telegrafisten-Beamten, ein Jahr später, trat ich in die Realschule Bad-Kreuznach ein, die ich bis zum Jahre 1924 besuchte. Nach der Pensionierung meines Vaters zogen meine Eltern nach Dreifsen-Pfalz. Von 1924 bis 1929 besuchte ich die Ober-Realschulen in Mannheim und Kaiserslautern (Abitur).

Von 1929 bis 1934 widmete ich mich dem medizinischen Studium an den Universitäten Heidelberg und Wien. Am 21. Dezember 1934 schloß ich mein Studium mit dem Staatsexamen in Heidelberg ab.

Vom 1. Januar 1935 bis zum 1. Januar 1936 war ich am Bürgerhofspital Saarbrücken (Innere Abt.) und am Krankenhaus Raftpfehl Saarbrücken (Chirur. Abt.) als Praktikant tätig. Am 1. Januar 1936 wurde ich von letztgenannter Anstalt als Volontär-Assistent übernommen.

Seit dem 1. Februar dieses Jahres habe ich die Praxis des Herrn Dr. Keller-Saarbrücken vertretungsweise übernommen.





